

## 八、耳和乳突疾病(H60-H95)

有关分类的某些说明如下所示。

1. 慢性化脓性中耳炎的分类 中耳包括鼓室、咽鼓管、鼓室和乳突腔。鼓室有顶、底、内、外、前、后六个壁,鼓室内容物有听骨、肌肉、韧带、囊袋和神经。

慢性化脓性中耳炎分为三型。

(1) 单纯型:按慢性化脓性中耳炎分类,编码为H66.3,主导词为“耳炎”。如果特指鼓室隐窝则编码为H66.2,咽鼓管的编码是H66.1。

(2) 胆脂瘤型:编码为H71,主导词为“胆脂瘤”。在国内2012版《中耳炎临床分类和手术分型指南》中,中耳胆脂瘤已与化脓性中耳炎并列,独立为一类中耳炎性疾病,但目前仍沿用H71编码。

(3) 骨疡型(骨疽):编码区分具体部位,听骨编码为H74.3,乳突为H70.1,笼统的中耳编码为H74.8,主导词为“骨疽”。

慢性化脓性中耳炎分类时,应注意区分中耳炎的类型及病变部位。

未特指的化脓性中耳炎编码为H66.4,其中的“未特指”表示未特指化脓性中耳炎的急性、慢性。未特指的中耳炎编码为H66.9,其“未特指”表示未指出中耳炎的临床表现是化脓性还是非化脓性。

2. 听力损失和耳聋 听力损失又称听力丧失、耳聋,可以分为三种情况

(1) 传导性耳聋(H90.0-H90.2),由于外耳道、中耳的缺陷造成的损失。

(2) 感音神经性聋(H90.3-H90.5),由于螺旋器、听神经和听觉中枢的器质性病变,导致对声音的感受与神经冲动的传导发生障碍,引起的听力下降。

(3) 混合性传导性和感音神经性听力损失(H90.6-H90.8)。

听力损失的其他分类编码为H91,与潜在原因有关,例如:耳毒性听力损失(H91.0)是由摄入有毒物质引起的。H90包括先天性聋,但不包括噪声性聋(H83.3)。H91不包括心因性聋(F44.6)。